

PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM RADIOIODO OU PCI COM IODO-131 OU IODO-123 COM THYROGEN®

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro, 15 minutos antes do horário marcado;
2. Trazer pedido médico original e carteirinha do convênio (quando utilizar);
3. Documento pessoal com foto para cadastrar o exame: RG.
4. É necessário acompanhamento para menores de 18 anos e maiores de 80 anos ou pacientes com alguma limitação;
5. Em caso de dúvidas ou cancelamento entrar em contato com o CDI no telefone (62) 3121-7272 e whatsapp (62) 99999-3336.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO:

- Jejum de 4 horas. É necessário suspender também a ingestão de líquidos, inclusive de água.
- É necessário passar lista de medicamentos, pois alguns podem interferir no procedimento.
- Se for mulher em idade fértil e não laqueada, trazer exame de Beta HCG realizado num período de tempo menor que 3 dias antes do início do procedimento.
- Iniciar dieta pobre em IODO 2 semanas antes do procedimento.
- Manter o uso de hormônio tireoidiano conforme prescrito pelo seu médico.
- **DEVEM SER SUSPENSOS:**
 - Xaropes expectorantes, polivitamínicos: suspender por 1 semana.
 - Amiodarona (Ancoron, Atlansil, Angiodarona, Miodaron): suspender por 6 meses.
 - Iodo tópico (povidine, usado em cirurgias): suspender por 2 semanas.
- **MULHERES EM IDADE FÉRTIL:**
 - Trazer exame de BETA HCG (teste de gravidez) colhido no máximo 3 dias antes do exame.

EXAMES QUE INTERFEREM NO PROCEDIMENTO:

- Exames radiológicos com uso de contraste iodado: evitar por 1 a 6 meses (caso tenha realizado exame radiológico com uso de meio de contraste iodado nos últimos 6 meses, avisar à nossa equipe para averiguação com os médicos responsáveis pelo procedimento).

DIETA:

- Para tratamentos com iodo radioativo deve-se reduzir por 2 semanas as fontes de iodo da dieta alimentar e de produtos de beleza (base esmaltes, tinturas de cabelo, bronzeadores).

ITENS	NÃO PERMITIDO	PERMITIDO
SAL	Sal iodado, salgadinhos, batata frita industrializada	Diminuir o sal da comida para a metade da ingestão habitual
PEIXES	Peixes, frutos do mar, camarão, ostras, algas	

CARNES	Carne defumada, carne de sol, caldo de carne, embutidos ou carne industrializadas, bacon, salsicha, linguiça, frios (presunto, mortadela, salame)	Carnes frescas ou congeladas
LATICÍNIOS	Leite, sorvete, queijo, requeijão, iogurte, leite de soja, tofu	Leite em pó desnatado e margarina sem sal
OVOS E MOLHOS	Gema de ovo, maionese, molho de soja	Clara de ovo, ervas, óleo, azeite, vinagre
FRUTAS	Frutas enlatadas ou em caldas	Frutas frescas e sucos, frutas secas sem sal
VEGETAIS	Enlatados e conservas (azeitonas, pickles, cogumelo, chucrute, etc.) Agrião, aipo, couve de bruxelas, repolho	Alface, batata sem casca, beterraba, cebola, cenoura, cogumelo fresco, ervilhas, nabo, pepino, tomate, vagem
PÃES, MASSAS, CEREAIS E GRÃOS	Pães industrializados, pizza, cereais em caixas	Pão caseiro, pão francês, bolacha integral ou cream cracker, macarrão e massa sem ovos, arroz, aveia, cevada, farinha, feijão, milho, trigo
DOCES	Doces com gema de ovos, chocolate, leite	Açúcar, mel, geléia, balas (exceto balas vermelhas, escuras)
BEBIDAS	Café instantâneo ou solúvel, chá industrializados e refrigerantes cola (coca-cola, pepsi)	Café de filtro, sucos e chá naturais

O QUE É O EXAME:

- A pesquisa de corpo inteiro com iodo radioativo é um exame indicado para a avaliação de alguns pacientes com diagnóstico prévio de câncer diferenciado da tireoide, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão.

COMO É FEITO O EXAME:

- Anteriormente à data de administração do iodo radioativo, são administradas duas doses de tirotrófina alfa (THYROGEN®), através de injeção intramuscular, em dois dias consecutivos. A dose de iodo radioativo é realizada no 3º dia.
- As imagens são realizadas 24 horas e 48 horas após a administração do iodo radioativo
- Cronograma:
 - 1º dia: é administrada a 1ª dose do Thyrogen®, por via intramuscular.
 - 2º dia é administrado a 2ª dose do Thyrogen®, por via intramuscular.
 - 3º dia é administrado o radiofármaco, por via oral.
 - 4º dia: realização das 1as imagens (região cervical). Duração das imagens: aproximadamente 10 minutos.
 - 5º dia: realização das imagens de corpo inteiro. Duração das imagens: aproximadamente 1 hora.
- Este procedimento não deve ser realizado em gestantes. Em caso de suspeita de gravidez informar à nossa equipe **ANTES** da injeção.