

TOMOGRAFIAS GERAIS

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro, 20 minutos antes do horário marcado;
2. Trazer pedido médico original e carteirinha do convênio (quando utilizar);
3. Documento pessoal com foto para cadastrar o exame: RG.
4. É necessário acompanhamento para menores de 18 anos e maiores de 80 anos ou pacientes com alguma limitação;
5. Paciente com alteração da função renal, tais como: Insuficiência renal aguda, crônica ou transplante renal, deverão trazer exames recentes (últimos 60 dias) de ureia e creatinina. Na falta desses, o médico pode solicitar o exame laboratorial. Paciente com insuficiência renal crônica deverão avisar sobre sua condição antes da realização do exame.
6. Na ocasião do exame, haverá uma entrevista para a triagem de contraindicações aos exames.
7. Em caso de dúvidas ou cancelamento entrar em contato com o CDI no telefone (62) 3121-7272 e whatsapp (62) 99999-3336.

OBS: É de extrema importância trazer os exames de sangue mais recentes e os últimos exames de imagem de tomografia, cintilografia, ultrassom e ressonância. (Trazer CD/DVD caso tenha).

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PREPARO (TODOS OS PACIENTES):

- **PARA ESTE EXAME NÃO É NECESSÁRIO JEJUM, RECOMENDA-SE DIETA LEVE.**

Pacientes que fazem uso de METFORMINA (Glifage, Glifage XR, Gluconvance, Meritor) seguir as seguintes orientações:

Situação I) Em pacientes **sem** história de insuficiência renal aguda no momento do exame e com Clearance de Creatinina ≥ 30 ml/min/1,73 m², **NÃO É** indicada a suspensão da metformina, nem antes e nem após o exame.

Situação II) Em pacientes **com** história de insuficiência renal aguda e/ou com clearance de creatinina < 30 ml/min/1,73 m², **RECOMENDA-SE** a suspensão da metformina no dia do exame e por 48 horas (após nova dosagem da função renal).

PACIENTES COM HISTÓRICO DE ALERGIA AO MEIO DE CONTRASTE

Considera-se histórico de alergia: reação alérgica a exames com contraste.

- Pacientes **com** história prévia de alergia leve ao meio de contraste (prurido e vermelhidão);
- Pacientes **com** história prévia de doenças alérgicas de moderadas a graves: asma grave, alergias alimentares graves, edema de glote ou choque anafilático a outras medicações (exceto meio de contraste) ou alimentos.

Obs .1: História prévia de reação grave ao meio de contraste CONTRAINDICA o exame contrastado (em caso de dúvida, consulte o médico radiologista).

CDI: Se você conhece, você sabe a diferença!

UNIDADE II (EM FRENTE AO ÓRION): AV. PORTUGAL, 1155 - ST. MARISTA, CEP.: 74150-030, GOIÂNIA - GO
MEDICINA NUCLEAR / PET-CT: AV. PORTUGAL, 600 - ST. OESTE, CEP.: 74140-020, GOIÂNIA - GO
TEL.: ☎ (62) 3121-7272 / 📞 (62) 99999-3336 / WWW.CDIGOIAS.COM.BR

Obs. 2: Náuseas, vômitos e alergias a frutos do mar NÃO SÃO contraindicações ao exame.

PROTOCOLO DE PREPARO PARA PACIENTES COM HISTÓRIA PRÉVIA DE ALERGIA:

- **Prednisona 40mg VO + Loratadina 10 mg VO, 12 horas e 2 horas antes do procedimento.**
- **Seguir as orientações gerais citadas acima.**
- O médico realizará uma nova entrevista para caso necessite de uso de antialérgico na clínica.

O QUE É O EXAME:

- A tomografia computadorizada (TC) trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação x e permite obter a reprodução de uma seção do corpo humano em quaisquer uns dos três planos do espaço. A TC permite enxergar todas as estruturas em camadas, principalmente os tecidos mineralizados, com uma definição admirável, permitindo a delimitação de irregularidades tridimensionalmente. A duração do exame é de 10-15 minutos e o tempo de permanência na clínica é de aproximadamente 2 horas.