

ANGIOTOMOGRAFIA

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. Recomendamos que se apresente ao local indicado para abertura de cadastro 20 minutos antes do horário marcado;
2. Trazer pedido médico original e carteirinha do convênio (quando utilizar);
3. Documento pessoal com foto;
4. É necessário acompanhamento para menores de 18 anos e maiores de 80 anos ou pacientes com alguma limitação;
5. Paciente com alteração da função renal, tais como: Insuficiência renal aguda, crônica ou transplante renal, deverão trazer exames recentes (últimos 60 dias) de ureia e creatinina. Na falta desses, o médico pode solicitar o exame laboratorial. Paciente com insuficiência renal crônica deverão avisar sobre sua condição antes da realização do exame.
6. Na ocasião do exame, haverá uma entrevista para a triagem de contraindicações aos exames.
7. Em caso de dúvidas ou cancelamento entrar em contato com o CDI no telefone (62) 3121-7272 e whatsapp (62) 99999-3336.

OBS: Recomendamos trazer os exames de sangue mais recentes e os últimos exames de imagem de tomografia, cintilografia, ultrassom e ressonância. (Trazer CD/DVD caso tenha).

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O PREPARO (TODOS OS PACIENTES):

- **PARA ESTE EXAME NÃO É NECESSARIO JEJUM, RECOMENDA-SE DIETA LEVE.** Evitar refrigerantes ou líquidos gaseificados, álcool, café, cigarro no período que está marcado o exame.

Pacientes que fazem uso de **METFORMINA (Glifage, Glifage XR, Gluconvance, Meritor)** seguir as seguintes orientações:

Situação I) Em pacientes sem história de insuficiência renal aguda no momento do exame e com Clearance de Creatinina ≥ 30 ml/min/1,73 m², NÃO É indicada a suspensão da metformina nem antes e nem depois do exame.

Situação II) Em pacientes com história de insuficiência renal aguda e/ou com clearance de creatinina < 30 ml/min/1,73 m², RECOMENDA-SE a suspensão da metformina no dia do exame e por 48 horas (após nova dosagem da função renal).

PACIENTES COM HISTÓRICO DE ALERGIA AO MEIO DE CONTRASTE

Considera-se histórico de alergia: reação alérgica a exames com contraste.

- Pacientes **com** história prévia de alergia leve ao meio de contraste (prurido e vermelhidão);
- Pacientes **com** história prévia de doenças alérgicas de moderadas a graves: asma grave, alergias alimentares graves, edema de glote ou choque anafilático a outras medicações (exceto meio de contraste) ou alimentos.

Obs .1: História prévia de reação grave ao meio de contraste CONTRAINDICA o exame contrastado (em caso de dúvida, consulte o médico radiologista).

Obs. 2: Náuseas, vômitos e alergias a frutos do mar NÃO SÃO contraindicações ao exame.

PROTOCOLO DE PREPARO PARA PACIENTES COM HISTÓRIA PRÉVIA DE ALERGIA:

- **Prednisona 40mg VO + Loratadina 10 mg VO, 12 horas e 2 horas antes do procedimento.**

CDI: Se você conhece, você sabe a diferença!

UNIDADE II (EM FRENTE AO ÓRION): AV. PORTUGAL, 1155 - ST. MARISTA, CEP.: 74150-030, GOIÂNIA - GO
MEDICINA NUCLEAR / PET-CT: AV. PORTUGAL, 600 - ST. OESTE, CEP.: 74140-020, GOIÂNIA - GO
TEL.: ☎ (62) 3121-7272 / 📠 (62) 99999-3336 / WWW.CDIGOIAS.COM.BR

- Seguir as orientações gerais citadas acima.

O QUE É O EXAME:

- Angiotomografia é um exame de diagnóstico por imagem que usa um tomógrafo moderno para evidenciar características de veias e artérias. É necessário realizar uma punção na veia do braço para administração dos medicamentos e meio de contraste (caso necessário). Antes do exame será feita uma entrevista para verificar a frequência cardíaca. O tomógrafo irá passar uma gravação de voz para prender a respiração algumas vezes. Preste atenção na respiração para finalizar seu exame com sucesso. Após a realização do seu exame, você ficará em observação por alguns minutos até a liberação do médico. A duração do exame é de 10-15 minutos e o tempo de permanência na clínica é de aproximadamente 2 horas.